



X-Plain™

Cáncer Del Seno

Sumario

El cáncer del seno es la forma de cáncer más común que afecta a la mujer.

Cada año, aproximadamente 1 de cada 10 mujeres es diagnosticada con cáncer del seno.

Este programa de educación al paciente le ayudará a entender el diagnóstico y las opciones de tratamiento para el cáncer del seno.

Cáncer y sus causas

El cuerpo está formado de células muy pequeñas.


Las células normales del cuerpo crecen y mueren de forma controlada.

A veces las células siguen dividiéndose y creciendo sin control normal, lo cual causa un crecimiento anormal llamado un tumor.

Si el tumor no invade los tejidos y órganos cercanos, se llama un tumor benigno, o crecimiento no canceroso. Los tumores benignos rara vez representan un peligro de muerte.

Si el tumor invade y destruye las células cercanas, se llama un tumor maligno o canceroso. El cáncer puede amenazar la vida de una persona.

Las células cancerosas también pueden extenderse a diferentes partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y canales linfáticos.



La linfa es un fluido casi claro producido por el cuerpo que drena desperdicios de las células. Viaja a través de vasos especiales y estructuras con forma de frijol, llamadas nódulos linfáticos.

Los tratamientos de cáncer matan o controlan a las células cancerosas que crecen anormalmente.

Los cánceres del cuerpo son nombrados de acuerdo a dónde el cáncer se originó. El cáncer que empieza en el cerebro siempre se llamará cáncer cerebral, aún cuando se haya extendido a otra parte del cuerpo como el hígado, los huesos, o los pulmones.

Aunque los médicos pueden ubicar el lugar en donde se origina el cáncer, frecuentemente la causa del cáncer no puede ser identificada.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.


Las células contienen material hereditario o genético llamado cromosomas. Este material genético controla el crecimiento de la célula.

El cáncer siempre surge de cambios que ocurren en estos materiales genéticos. Cuando el material genético de una célula se vuelve anormal, puede perder su habilidad de controlar su propio crecimiento.

Estos cambios súbitos en el material genético pueden ocurrir por varias razones. Esta tendencia puede heredarse de los padres. Los cambios en los materiales genéticos también pueden ocurrir debido a la exposición a las infecciones, drogas, tabaco, químicos, u otros factores.

Anatomía de los senos

Los senos contienen tejidos grasos y glándulas.



Las glándulas fabrican la leche después de un embarazo. Ellas responden a muchas hormonas femeninas, tales como el estrógeno y la progesterona.

La leche es secretada al exterior mediante conductos especiales, los cuales se abren en el pezón.

El sistema linfático normalmente drena el exceso de fluido en el seno en los nódulos linfáticos de la axila. De ahí, va de vuelta al torrente sanguíneo.

Los senos están ubicados sobre músculos importantes que permiten el movimiento del brazo, así como sobre los músculos que participan en la respiración.

Cáncer del seno

El cáncer del seno se puede originar en una de las glándulas o de los conductos de los senos.

Si el cáncer se origina en las glándulas, es llamado carcinoma lobular. Los lóbulos son las glándulas que producen la leche.

Cuando el cáncer ocurre en los conductos de los senos se llama *carcinoma ductal*.

Cuando el cáncer se extiende más allá del área contigua, se llama *cáncer infiltrante o invasivo*.

El cáncer que no ha cruzado más allá del lóbulo o túbulo se llama *carcinoma in-situ*.

El cáncer del seno puede involucrar a más de un miembro de la familia; esto se llama cáncer del seno familiar. Pueden haber causas hereditarias y genéticas para este tipo de cáncer del seno. Avances recientes en el campo de la genética médica han permitido la detección de algunos de estos genes.

Las mujeres con cáncer del seno familiar definitivamente pueden beneficiarse de consultas genéticas y posiblemente de exámenes genéticos.

Señales y síntomas

El cáncer del seno usualmente no tiene síntomas en sus etapas iniciales.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

Más tarde, mientras el cáncer crece, puede causar un tumor que se puede sentir en el seno.

A veces la piel que cubre el tumor se vuelve áspera y arrugada. Esto es llamado *peau d'orange* en francés, o piel de naranja.

Secreción a través del pezón también puede ser señal de cáncer del seno.

La mayoría de los casos de cáncer del seno son descubiertos por un auto-examen o por mamografías.

Diagnóstico

Cuando se ha detectado el cáncer del seno, a continuación se suele hacer una operación para quitar el tumor y para determinar qué tipo de cáncer es y en qué etapa se encuentra.

Durante la operación, el cirujano puede examinar los nódulos linfáticos en la axila para ver si el cáncer está presente en ellos. Un patólogo revisará el tejido removido en el momento de la cirugía y determinará si el tumor es canceroso o no.



Si el tumor es canceroso, se pueden hacer otros exámenes patológicos más especializados con el tejido. Su cirujano y oncólogo pueden pedirle que se haga más exámenes radiológicos.

Algunos de los exámenes patológicos determinan con qué velocidad las células cancerosas se están multiplicando en comparación con las células normales de los senos. Otros exámenes patológicos determinan si las células cancerosas están bajo la influencia de hormonas femeninas normales tales como estrógeno y progesterona. Esto es llamado el examen del receptor de estrógeno y progesterona.

Los exámenes radiológicos pueden incluir una escanografía de los huesos y una tomografía axial computarizada, o TAC, para averiguar si el cáncer se ha extendido más allá del seno y el área de la axila.

Etapas

La etapa indica cuánto se ha expandido el cáncer. La evaluación de la etapa en que se encuentra el cáncer conlleva un procedimiento médico que determina si el cáncer se ha expandido a los nódulos linfáticos. El tratamiento recomendado depende de la etapa del cáncer.

Las etapas suelen ser descritas usando los números 0 al 4; un número menor indica una etapa más temprana del cáncer.

Algunas etapas del cáncer pueden ser divididas en sub-etapas. Estas sub-etapas son designadas por medio de letras. Por ejemplo, hay una etapa 3A y una etapa 3B. Una etapa 3B es más avanzada que una etapa 3A.

La etapa 0 de cáncer del seno es carcinoma in-situ. Cuando se origina de un lóbulo es llamado Carcinoma Lobular In Situ o CLIS. Cuando se origina de un túbulo es llamado Carcinoma In Situ Tubular o CIST.

En la etapa 1 el tumor canceroso mide menos de una pulgada y no se ha extendido más allá del seno.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

El cáncer del seno de la Etapa 2 puede ser uno de los siguientes: - puede medir menos de una pulgada pero ya se ha extendido a los nódulos linfáticos en la axila - puede medir de 1 a 2 pulgadas y haber extendido o no a los nódulos linfáticos en la axila – puede medir dos pulgadas y no haberse extendido a los nódulos linfáticos en la axila.

El cáncer de Etapa 3A puede ser uno de los siguientes:

Medir menos de dos pulgadas y haberse extendido a los nódulos linfáticos en la axila y a otros nódulos linfáticos más allá de la axila. Medir 2 pulgadas o más y sólo haberse extendido a los nódulos linfáticos de la axila.

El cáncer del seno de la etapa 3B puede ser uno de los siguientes:

-el cáncer que ha afectado ya la piel o la pared del pecho;

-el cáncer que se ha extendido a los nódulos linfáticos en el interior del pecho alrededor del esternón

El cáncer del pecho en la etapa 4 se ha extendido hasta otros órganos tales como los huesos, el hígado, el cerebro o los nódulos linfáticos del cuello y del área de la clavícula.

Cirugía

La mayoría de los cánceres del seno son removidos quirúrgicamente. La extensión de la cirugía depende del tamaño del tumor y de si los nódulos linfáticos de la axila están incluidos o no.



Las operaciones de cáncer del seno tienen dos objetivos primarios. El primero es quitar el tumor entero sin dejar ninguna parte del tumor en el área del seno.

El segundo objetivo es examinar los nódulos linfáticos de la axila para asegurarse que el tumor no se ha expandido hasta ellos. Si se ha expandido a los nódulos linfáticos, el cirujano determinará cuántos nódulos linfáticos están afectados por el tumor.

Ya que el quitar muchos nódulos linfáticos quirúrgicamente puede llegar a producir hinchazón del brazo, llamado *linfedema*, se desarrollan nuevas técnicas para quitar sólo algunos nódulos linfáticos importantes.

Varias horas antes de la cirugía, el cirujano inyecta un colorante azul o un colorante radioactivo seguro cerca del tumor.

Durante la cirugía, el cirujano remueve el cáncer y busca los nódulos linfáticos que han tomado el colorante. El primer nódulo linfático que toma el colorante es llamado el *nódulo centinela*.

Una lumpectomía es una operación en la que se remueve el tumor canceroso y se hacen biopsias de los nódulos linfáticos de la axila. Se suele hacer radioterapia después de que se hace este tipo de cirugía.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

En una mastectomía parcial o segmental la parte del seno que se remueve es más grande que la removida en una lumpectomía. Además, durante este procedimiento se remueve parte de la capa de tejido que recubre el músculo subyacente. Se suele necesitar radioterapia después de este tipo de operación. Algunos nódulos linfáticos son removidos para evaluar la expansión del cáncer.

Una mastectomía total o simple tiene como objetivo remover el seno entero, incluyendo algunos de los nódulos linfáticos en la axila.

Una mastectomía radical modificada tiene como objetivo remover el seno, una parte de la capa de tejido que recubre el músculo y posiblemente parte del músculo. Algunos de los nódulos linfáticos de la axila también son removidos durante este tipo de operación.

Una mastectomía radical tiene como objetivo remover el seno entero, los músculos y todos los nódulos linfáticos de la axila. Raramente se hace esta operación.

Tratamiento adicional

Después de la cirugía, su médico quizás recomendará uno o más tipos de terapia para prevenir que el cáncer recurra. Terapias de seguimiento comunes incluyen terapia de radiación, terapia hormonal y quimioterapia.

La radioterapia consiste de una serie de tratamientos de rayos X, cuyo objetivo es eliminar del seno o de los nódulos linfáticos cualquier célula cancerosa que pueda estar presente. Suele tomar entre 5 y 6 semanas de tratamientos breves para completarse.

Se suele administrar la radioterapia después de una lumpectomía o después de una mastectomía

si el tumor midió más de dos pulgadas,

si existe un número grande de nódulos linfáticos afectados por el cáncer y si el tumor se encontraba cerca de los músculos de las paredes del pecho o de las costillas.

La terapia hormonal y la quimioterapia son tratamientos que pueden ser recomendados después de la cirugía para prevenir que el cáncer recurra. Estos pueden ser administrados mediante una línea intravenosa al flujo sanguíneo u oralmente.

La terapia hormonal se suele administrar si se encontró que el cáncer tenía receptores de estrógeno o progesterona. La presencia de estos receptores generalmente significa que estas hormonas promueven el crecimiento del cáncer.

La terapia hormonal con Tamoxifen o drogas similares puede bloquear el efecto de progesterona y estrógeno. Después de la cirugía de cáncer del seno, es posible que se recomiende que a las mujeres premenopáusicas se le remuevan los ovarios para que no produzcan más estrógeno y progesterona.

Se suele administrar quimioterapia en casos de que el tumor del seno ya estaba bastante grande o ya se había expandido a otros órganos del cuerpo. A veces se administra la quimioterapia para disminuir el riesgo de la recurrencia aún si el cáncer del pecho no se ha extendido más allá del seno.

Hay muchas circunstancias diferentes donde la quimioterapia puede ser recomendada. Su oncólogo discutirá con usted las diferentes alternativas y recomendará la que él o ella crea ser la más apropiada en su caso.

Los ensayos clínicos también son otro tipo de tratamiento disponible; son una manera de probar nuevas opciones de tratamiento. Se piensa que estas pruebas son tan efectivas

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

como los mejores tratamientos disponibles. Pueden ser una combinación de todos los tratamientos anteriormente mencionados.

Después del diagnóstico

Después del diagnóstico de cáncer del seno es normal que la mayoría de los pacientes se preocupen sobre los efectos de las opciones de tratamiento tales como la cirugía y la quimioterapia. Afortunadamente, hay varias opciones disponibles para ayudar a los pacientes a verse y sentirse mejor.

La cirugía plástica y las prótesis están disponibles para hacer el cambio de apariencia del paciente lo menos notorio posible.

En algunos casos, la quimioterapia puede causar una pérdida de pelo temporal. Hay pelucas excelentes. Elegir por adelantado una que vaya con su pelo y peinado es una buena idea.

Hay varias redes de apoyo al paciente con personas que han experimentado procedimientos similares. Los sobrevivientes de cáncer del seno, grupos de apoyo y redes de pacientes están dispuestos a compartir sus experiencias y apoyo. Suele ser un paso positivo hacia una recuperación cuando uno se junta con un grupo de apoyo y conoce a otras personas que puedan entender sus sentimientos.

Resumen

El cáncer del seno es uno de los cánceres más comunes.

La detección temprana mejora las posibilidades de cura y supervivencia. Los auto-exámenes regulares y las mamografías son muy importantes.



Las opciones de tratamiento, incluyendo las cirugías salva-senos, están disponibles hoy día.

La perspectiva actual del futuro para la mujer con cáncer del seno está mejor que nunca.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.